癌腫	レジメン名	1クールの日数
多発性骨髄腫	DLd	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法 投与速度 ———					与スケジュ・	ール		
米 四石	汉 分 里	双子 刀压	- 万法	Day1	Day2~	Day8	Day9~	Day15	Day16~	Day22~
ダラツムマブ(1・2サイクル目)	16mg/kg	点滴	添付文書参照	\	_	↓	_	↓	_	_
ダラツムマブ (3~6サイクル目)	16mg/kg	点滴	添付文書参照	↓	_	_	_	↓	_	_
ダラツムマブ(7サイクル目以降)	16mg/kg	点滴	添付文書参照	↓	_	_	_	_	_	_
レナリドミド	添付文書参照	内服		↓	↓	↓	↓	\	↓	_

【支持療法】	催吐リスク
デキサメタゾン	軽度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
多発性骨髄腫	E-Pd	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法 投与速度 ——				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	与スケジュ-	ール				
米 吅石	汉 子里	1X - 7 71 / A	汉	双子刀法	汉	Day1	Day2~	Day8	Day9~	Day15	Day16~	Day22~
エロツズマブ(1・2サイクル目)	10mg/kg	点滴	添付文書参照	↓	_	↓	_	↓	_	_		
エロツズマブ(3サイクル目以降)	20mg/kg	点滴	添付文書参照	↓	_	_	_	_	_	_		
ポマリドミド	添付文書参照	内服		↓	↓	↓	↓	↓	↓	_		

【支持療法】	催吐リスク
デキサメタゾン	軽度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
多発性骨髄腫	Kd	28日

【投与量・投与スケジュール】

 	投与量	投与方法 投与速度 ——			投与スケ	ジュール			
米 叩石	(文 分 里			(文子还反 	Day1	Day2~	Day8	Day9~	Day15
カルフィルゾミブ(1サイクル目)	20mg/kg	点滴	30分	↓	_	_	_	_	_
カルフィルゾミブ(1サイクル目)	70mg/kg	点滴	30分	_	_	↓	_	\downarrow	_
カルフィルゾミブ(2サイクル目以降)	70mg/kg	点滴	30分	↓	_	↓	_	\	_

【支持療法】	催吐リスク
デキサメタゾン	軽度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
多発性骨髄腫	VRd	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与专注	投与方法 投与速度 —			投与スケ	ジュール		
米叩石	汉 子皇	汉子刀広		Day1	Day2~	Day4	Day5~	Day8	Day9~
ボルテゾミブ	1.3mg/m²	皮下注		\	_	\downarrow	_	↓	_
レナリドミド	添付文書参照	内服		↓	↓	\downarrow	↓	↓	↓

【支持療法】	催吐リスク
デキサメタゾン	軽度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
多発性骨髄腫	IsaPd	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度 -	投与スケジュール							
米吅石	(X) 子里	(X子/) 法		Day1	Day2~	Day8	Day9~	Day15	Day16~		
イサツキシマブ(1サイクル目)	10mg/kg	点滴	添付文書参照	\	_	\	_	↓	_		
イサツキシマブ(2サイクル目以降)	20mg/kg	点滴	添付文書参照	\	_	_	_	↓	_		
ポマリドミド	添付文書参照	内服		+	+	↓	\	\	↓		

【支持療法】	催吐リスク
デキサメタゾン	軽度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
多発性骨髄腫	BD皮下注	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	松片士 汁	投与方法 投与速度 -				投与スケ	ジュール			
米 吅石	(文子里) 	(文字//法	投与速度 -	Day1	Day2~	Day4	Day5~	Day8	Day9~	Day11	Day12~
ボルテゾミブ	1.3mg/m²	皮下注		↓	_	\downarrow	_	\	_	↓	_

【支持療法】	催吐リスク
デキサメタゾン	軽度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
多発性骨髄腫	DBd	21日

【投与量・投与スケジュール】

	松 与昙	投与量	松 与	쓰 느를	₩ 片 导	松 与 导	산 두를	也 上 号	投与方法	投与去注	松片	投与方法 投与速度	投与スケジュール							
朱阳石	(X) 子里	(文 子 刀法	汉 <i>宁</i> 述及	Day1	Day2~	Day4	Day5~	Day8	Day9~	Day11	Day12~	Day15	Day16~							
ダラツムマブ(1~3サイクル目)	16mg/kg	点滴	添付文書参照	\	_	_	_	↓	_	_	_	\	_							
ボルテゾミブ(1~3サイクル目)	1.3mg/m²	皮下注		↓	_	\	_	↓	_	↓	_	_	_							
ダラツムマブ(4~8サイクル目)	16mg/kg	点滴	添付文書参照	↓	_	_	_	_	_	_	_	_	_							
ボルテゾミブ(4~8サイクル目)	1.3mg/m²	皮下注		↓	_	↓	_	↓	_	↓	_	_	_							
ダラツムマブ(9サイクル目以降)	16mg/kg	点滴	添付文書参照	↓	_	_	_	_	_	_	_	_	_							

【支持療法】	催吐リスク
デキサメタゾン	軽度